

OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

72,896

**MÉLANGES**  
**EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES**

TRENTIÈME FASCICULE

(10 juin 1919)

PAR

**MAURICE PIC**

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE  
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE  
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »  
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS  
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE  
E. REVÉRET, SUCESSEUR

1919

Tous droits réservés

LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

67181083773

# Nouveautés diverses



**Sibinia submaculata** (1) n. sp. Oblongus, opacus, rufescens, thorace obscuriore, pro parte dense late squamulatus, rostro apice, antennis pedibusque testaceis; rostro arcuato; thorace satis breve, antice attenuato, in disco et lateraliter griseo lineato; scutello griseo; elytris thorace paulo latioribus, satis brevibus, postice modice attenuatis, apice subrotundatis, striatis, squamulis fuscis aut griseis ornatis, lateraliter et postice distincte griseo maculatis; pygidio parum prominulo; infra corpore albo squamulato. Long. 1,5 mill. Djibouti. — A placer près de *S. bipunctata* Kirsch.

**Nanophyes Donckieri** v. nov. **sinensis**. Niger, elytris in disco pallido maculatis, maculis pro parte junctis, antennis pedibusque testaceis. Chine (coll. Pic).

**Gonocnemis rufitarsis** n. sp. Parum elongatus, nitidus, hirsutus, niger, supra subæneus, tarsis rufis, elytris costatis. — Peu allongé, brillant, hérissé de poils clairs, noir avec des reflets bronzés en dessus, tarses roux; prothorax assez étroit, fortement et densément ponctué, à faible ligne lisse médiane; élytres pas très longs, subparallèles, peu atténués au sommet, carénés avec les intervalles largement ponctués. Long. 7 mill. Congo. — Peut se placer près de *G. viridis* K., qui est différent de coloration (ex description).

**Gonocnemis æneipennis** n. sp. parum elongatus, niti-

.....  
(1) Tous les types des espèces décrites ici font partie de ma collection.

— dus, hirsutus et pubescens, niger, elytris æneis, tarsi rufis ; elytris in disco incostatis, sed lineato-punctatis. Long. 6 mill. Congo. — Espèce rappelant la précédente, mais bien distincte par sa sculpture élytrale qui offre des rangées de gros points avec les intervalles médians déprimés et multiponctués à la base, subélevés et même carénés latéralement et au sommet.

**Gonocnemis opacus** n. sp. Satis latus, opacus, rufus, oculis et antennis pro maiore parte nigris ; thorace minutissime et dense punctato ; elytris satis latis, striatis, intervallis fere incostatis. Long. 9 mill. Afrique Orientale. — A placer près de *G. incostatus* Frm., en diffère par son aspect mat, le prothorax bien plus étroit que les élytres, les antennes largement noires, etc.

**Sosthenes Dufau** n. sp. Minutus, subparallelus, viridimetallicus, antennis pedibusque testaceis, articulis tribus ultimis antennarum obscuris, minute dilatatis ; capite breve, antice impresso ; thorace robusto, lateraliter rotundato, postice breve constricto, fortiter punctato ; elytris elongatis, antice valde impressis, humeris distinctis. Long. 2 mill. environ. Guadeloupe (Dufau, in coll. Pic). — Voisin de *S. parvulus* Chp.

**Dromiosalpingus** n. genus. Rostro parum breve, lateraliter subangulato ; antennis ad oculos insertis, articulis 5 ultimis minute dilatatis ; thorace elongato, antice tuberculis et setulis munito, postice valde strangulato et transverse depresso ; elytris sparse hirsutis, epipleuris apice fere indistinctis. — Genre voisin de *Notosalpingus* Blackb., établi pour l'ancien *S. distincticollis* Pic et espèces affines.

**Lanthanus luridus** n. sp. Oblongus, parum latus, niger, elytris rufis, antennis pedibusque testaceis. Long. 1,5 m. Colombie (coll. Pic). — Voisin de *L. brasiliensis* Pic, prothorax un peu moins large par rapport aux élytres, ces derniers de coloration moins claire, etc.

**Lissodema unifasciata** n. sp. Robustus, niger, capite thoraceque rufis, antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris nigris, antice testaceo fasciatis et postice testaceo maculatis. Long. 2 mill. Japon (coll. Pic). — Cette espèce peut rentrer dans un sous-genre nouveau, **Spinolissodema**, caractérisé par la forme trapue, le prothorax fortement denté sur les côtés, la massue des antennes de 3 gros articles très distincts, les élytres ponctués en rangées.

**Platylissodema maculata** n. sp. Atro-viridescens, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris ad humeros minute et postice oblique albo-luteo maculatis. Long. 3 mill. Iles Nias (coll. Pic). — Diffère de *P. Rouyeri* Pic, par les macules plus réduites et moins pâles.

**Falsolanthanus** n. genus. Rostro parum breve, articulo ultimo antennarum satis breve, antennis ante oculos insertis; thorace lateraliter minute dentato; humeris parum prominulis. — Genre intermédiaire entre *Platylissodema* Blair et *Platysalpingus* Blair, établi pour l'ancien *Lanthanus albonotatus* Pic.

**Platysalpingus rufonotatus** n. sp. Cœruleus, rostro antennis pro majore parte pedibusque pro parte rufis, elytris antice ad suturam rufo notatis. Long. 4 mill. Nouvelle-Guinée (coll. Pic). — Voisin de *P. cœruleus* Pic, dont les élytres sont concolores.

**Campsia** s. g. nov. **Blapidocampsia**. Thorace postice distincte marginato-sulcatulo; elytris oblongis, non gibbosis, apice dentatis, epipleuris antice late dilatatis, ad humeros subangulatis. — Sous-genre établi pour *C. pallidipes* Pic, *C. tucumana* Berg.

**Blapidocamaria angustior** n. sp. Angustatus, nitidus, viridi-æneus, elytris subrufescentibus, pedibus testaceis, antennis tarsisque nigris. Long. 12 mill. Brésil. — Plus étroit que *B. incostata* Pic, avec les élytres plus égales.

**Tenebriocamaria** n. gen. Antennis brevibus, apice dilatatis; thorace sinuato, postice lateraliter et antice post



oculos distincte marginato; elytris satis elongatis, impresso-foveolatis, epupleuris postice sinuatis; coxis anticis globulosis, distantibus; prosterno postice angulato; metasterno excavato, antice distincte mucronato. — Peut se placer près de *Camaria* Serv., très distinct par la forme de son prothorax et la structure élytrale.)

**Tenebriocamaria atra** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite thoraceque minutissime punctatis; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, fortiter et diverse impresso-foveolatis; pedibus parum elongatis. Long. 20-21 mill. Pérou.

**Allecula Chatanayi** n. sp. Minutus, parum elongatus, subnitidus, rufus, thorace lateraliter viridinotato, dense punctato; elytris rufis, post scutellum et lateraliter viridi notatis, illis striato-punctatis. Long. 4 mill. Madagascar. — Me paraît voisin de *A. discipennis* Frm., avec l'avant-corps plus clair et les élytres autrement colorés.

**Allecula minutissima** n. sp. Parum elongatus, subnitidus, niger, antennis ad basin elytrisque rufis; capite antice thoraceque postice rufo marginato, dense punctatis; antennis satis validis; elytris parum elongatis, subparallèles, punctato-striatis. Long. 4 mill. Madagascar. — Voisin du précédent, forme moins allongée, élytres concolores, etc.

**Allecula viridipennis** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris viridibus, antennis, tibiis tarsisque testaceis; thorace breve, parum dense punctato; elytris elongatis, apice acuminatis, striato-punctatis. Long. 6 mill. Madagascar. — Jolie espèce rappelant assez par sa forme *A. morio* F.

**Stenogena rufonotata** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, abdomine rufescente, antennis pedibusque testaceis, elytris nigris, apice in disco rufo maculatis. Long. 8 mill. Madagascar. — Voisin de *S. xanthopus* Frm., distinct, à première vue, par sa macule antéapicale rousse.

**Stenogena annulipes** n. sp. Elongatus, parum nitidus, ni-

ger, antennis pedibusque pallidis, femoribus ad basin tibiisque ad medium nigris, elytris apice breve rufo notatis. Long. 7 mill. Madagascar. — Voisin du précédent.

**Stenogena robusta** n. sp. Robustus, parum nitidus, niger, elytris brunnescentibus, antennis pedibusque pro parte rufescentibus; thorace dense punctato-plicato, postice impresso; elytris latis, parum elongatis, punctato-striatis; femoribus validis. Long. 10 mill. Madagascar. — Espèce très remarquable par sa forme rappelant certains *Hoplonyx* Th.

**Stenogenomorpha** nov. gen. Capite antice transverse sulcato, oculis approximatis; tarsi lamellatis, gracilibus, articulo 1° posticarum elongato; elytris apice mucronatis. — Les mucrons des élytres distinguent, à première vue, ce nouveau genre.

**Stenogenomorpha impressa** n. sp. Satis elongatus, antice et postice attenuatus, parum nitidus, fere glaber, niger, antennis apice tarsisque rufescentibus; capite satis breve, sparse et parum punctato; antennis gracilibus; thorace satis breve, minute marginato, postice fortiter impresso, sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, apice attenuatis et mucronatis, striato-punctatis, punctis apice evanescentibus; pedibus parum elongatis. Long. 13 mill. Madagascar. — Ressemble un peu à *St. madecassa* Frm., prothorax à ponctuation plus espacée, forme plus élargie avec les élytres différents.

**Synallecula atrovittata** n. sp. Oblongo-ovatus, rufescens, infra pro parte piceus, elytris in disco longitudinaliter nigro vittatis, antennis pedibusque pro parte nigris. Long. 7 mill. Gabon. — Voisin de *S. major* Pic, et très distinct par ses élytres à bande discale noire un peu oblique.

**Synallecula lateplagiata** n. sp. Subovatus, rufescens, antennis apice et abdomine pro parte nigris, elytris nigris, ad basin et ad suturam (apice excepto) rufis. Long. 7 mill. Gabon. — Très distinct du précédent par la forme

un peu moins allongée et les élytres en majeure partie noirs.

**Synallecula ruficornis** n. sp. Elongatus, fere opacus, rufo-castaneus, antennis pedibusque pallidioribus. Long. 5,5 mill. Fort Crampel. — Voisin de *S. Crampeli* Pic, prothorax plus large, antennes plus claires, etc.

**Orchesiolobopoda** nov. gen. Capite breve, inclinato, oculis satis approximatis, reniformibus; antennis gracilibus, articulo 3° elongato; tarsis anticis minutis, articulo penultimo posticarum minuto, simplice, unguis parum pectinatis; elytris antice excavatis, apice valde attenuatis, humeris nullis. — Ce genre, qui a le faciès d'*Orchesia* Latr., avec certains caractères de *Lobopoda* Sol., est établi pour la très petite espèce suivante :

**O. minutissima** n. sp. Antice et postice attenuatus, nitidus, sparse luteo pubescens, castaneus, capite thoraceque piceis; capite antice, antennis pedibusque pro parte testaceis; capite thoraceque fortiter et sparse punctatis; illo transverso, postice impresso; elytris post humeros breve dilatatis, apice valde attenuatis, antice ad scutellum excavatis, striatis, intervallis strangulatis, unipunctatis; femoribus posticis satis validis. Long. 3 mill. Brésil.

**Microcistela** nov. gen. *Cistelopsis* Frm. vicinus, sed oculis valde emarginatis et prominulis, subangulatis, articulo ultimo tarsarum paulo lobato facile distinguendus.

**Microcistela obscura** n. sp. Subovatus, parum convexus, mediocre pubescens, niger, capite antice, palpis, articulis 2 primis antennarum pedibusque pro parte testaceis; antennis elongatis, satis validis; thorace marginato, breve, antice arcuato, postice sinuato, dense punctato; elytris brevibus, valde attenuatis, minute striato-punctatis, distincte marginatis; pedibus parum gracilibus. Long. 3 mill. Nouvelle-Guinée.

**Astyloglossa** nov. gen. Capite elongato, rostrato; thorace lateraliter non marginato; elytris marginatis; pedi-



bus robustis, tarsis satis latis, pro parte lamellatis. — Genre voisin de *Octoglossa* Guer., en diffère, à première vue, par la tête longue et rostrifère, ainsi que par les articles des tarses moins larges.

**Astyloglossa cœruleipennis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, dense et minute punctatis, niger, thorace, scutello, pectore et femoribus ad basin late rufis ; elytris cœruleis, substriatis. Long. 15 mill. Bogota.

**Idgia maculatithorax** n. sp. Elongatus, fere opacus, capite nigro-cœruleo, antennis testaceis, articulo ultimo elongato et piceo ; thorace elongato, antice attenuato, testaceo, in disco nigro-cyaneo maculato ; elytris viridibus, dense punctatis ; pedibus cyaneis, femoribus ad basin late testaceis ; abdomine cyaneo-testaceo marginato. Long. 15 mill. Tonkin. — A placer près de *I. oculata* Redt.

**Astylomorphus** nov. gen. Capite rostrato ; antennis brevibus ; epipleuris nullis, lateraliter fere rectis. — Genre voisin de *Chalcas* Blanch., mais à faciès d'*Astylus* Cast., avec le bord des élytres infléchi en dessous. Le type du genre est mon ancien *Astylus viridimicans*, originaire du Vénézuëla, dont les élytres sont d'un vert métallique (forme type), ou bleus (v. nov. **cœrulescens**).

**Chalcas plicatus** n. sp. ♀. Elongatus, parum nitidus, sparse et parum distincte griseo pubescens, niger, elytris in disco rufo trimaculatis, longitudinaliter et lateraliter rufo lineatis. Long. 13 mill. Amérique Méridionale. — Paraît voisin de *C. 6-plagiatus* Frm. (ex description) et semble en différer par les dessins des élytres, dont les macules sont distantes entre elles, tandis que le prothorax est uniformément pubescent. Cette espèce peut rentrer dans un sous-genre nouveau, que je nomme **Pseudoastylus**, à épipleures indistincts avec le rebord élytral se relevant antérieurement, en dessus, pour former un pli ; le faciès rappelle certains *Astylus* Cast.

**Chalcas fasciculatus** n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris testaceis, ad basin nigro trima-

culatis, ad suturam et postice nigro marginatis, lateraliter nigro costatis, in disco medio longe fasciculatis. Long. 11 mill. Vénézuëla. — Ressemble à *C. abnormis* Frm. ♀, mais muni d'une touffe médiane de longs poils foncés et à rebord moins droit postérieurement.

**Chalcas Lajoyei** n. sp. Nitidus, scutello thoraceque distincte griseo pubescentibus, cyanescens, elytris antice et lateraliter luteo notatis, in disco minutissime carinatis. Long. 18-22 mill. Bogota. — La ♀ ressemble beaucoup à *C. luteonotatus* Pic (peut-être espèce voisine de *Bremei* Frm.), la forme élytrale est plus large, le prothorax peu sinué sur les côtés postérieurement, la coloration plus bleue, etc. ; le ♂ a la coloration générale foncée, mais plus bleue, de var. *Wheeleri* Pic (var. de *luteomaculatus* Pic), avec le prothorax peu sinué postérieurement.

**Chalcas Bremei** v. nov. **quinquenotatus** ♀. Elytris nigro cyaneis, lateraliter ad basin et postice testaceo notatis. Amérique Méridionale.

**Astylus anticejunctus** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, distincte pubescens, niger, elytris in disco parum distincte punctatis, apice longe spinosis, pallidis, sutura et apice nigro cinctis, in disco nigro bilineatis, lineis postice junctis. Long. 8 mill. Colombie. — Ressemble à *A. amabilis* Pic, mais élytres moins fortement ponctués, sans côte discale interne bien marquée.

**Astylus notaticollis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, mediocre pubescens, niger, thorace lateraliter rufo notato, elytris subviolaceis, lateraliter antice, ad medium in disco, et ante apicem rufo notatis. Long. 5,5 mill. Montévideo. — Espèce, par sa forme, voisine des précédentes, mais distincte entre toutes par son prothorax non entièrement foncé.

**Astylus atripes** n. sp. Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, griseo pubescens et sparse hirsutus, niger, elytris nigris, testaceo cinctis, in disco testaceo lineatis, et ante

apicem externe testaceo maculatis ; antennis pro parte rufis. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin de *A. tucumanensis* Pic, élytres plus largement foncés, pattes noires, forme convexe, etc.

**Astylus unicolor** n. sp. Oblongus, apice subacuminatus, nitidus, nigro-cyaneus ; capite elongato ; thorace breve, parum punctato, antice attenuato ; elytris satis latis, sinuatis, supra pro parte impressis, diverse sat sparse punctatis. Long. 8 mill. Amérique Méridionale : Cauca. — Parait voisin de *A. sex-guttatus* Kirch., dont il diffère, à première vue, par les élytres immaculés.

**Astylus testaceicornis** n. sp. Oblongus, sparse hirsutus, apice sinuato-acuminatus, nitidus, viridi-æneus, elytris lateraliter et in disco luteo lineatis, antennis testaceis ; capite parum elongato ; thorace satis breve, lateraliter subarcuato, diverse punctato (punctis minutis et majoribus) ; elytris parum latis, sinuatis, fortiter sat sparse punctatis. Long. 7 mill. Brésil. — Peut se placer près de *A. Baeri* Pic, très distinct, par sa coloration et ses antennes testacées.

**Astylus scalaris** n. sp. Minutus, subelongatus, fortiter punctatus, fere opacus, nigro-æneus, elytris rufis, nigro notatis, infra distincte griseo pubescens. Long. 4 mill. République Argentine. — Espèce très distincte entre toutes par son système de coloration, les dessins noirs des élytres formant une double croix échelonnée sur la suture, en outre épaules et sommet marqués de noir.

**Arthrobrachus Boucardi** n. sp. Oblongus, parum dense punctatus, nitidus, breve griseo pubescens, niger, antennis, palpis pedibusque testaceis, elytris testaceo-pallidis, in disco late piceis. Long. 4-4,5 mill. Paraguay. — Peut se placer près de *A. marginatus* Phil.

**Arthrobrachus longipilis** n. sp. Oblongus, nitidus, longe luteo pubescens, sparse punctatus, nigro-metallicus, antennis ad basin, palpis pedibusque rufis ; elytris nigro-metallicis, ad suturam et apice rufescentibus ; tibiis an-

ticis arcuatis ; elytris apice depressis et satis acuminatis, sutura elevata. Long. 5 mill. Paraguay. — Très distinct du précédent, ainsi que des autres espèces du genre, par sa particulière structure élytrale.

**Arthrobrachus Germaini** n. sp. Robustus, nitidus, niger, elytris rufis, ad scutellum breve nigro notato, tibiis tarsisque rufis ; thorace breve et lato, antice subtruncato, fortiter sat sparse punctato ; elytris latis, parum elongatis, apice subacuminatis, sat fortiter et dense punctatis. Long. 4 mill. Chili. — Ressemble à *A. rufipennis* Sol., élytres moins fortement ponctués, de coloration différente.

**Arthrobrachus minutus** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, elytris subæneis, apice rufo-tinctis, antennis pedibusque late nigris ; thorace breve, antice subtruncato, fortiter et sparse punctato ; elytris satis elongatis, sat fortiter et dense punctatis, ad suturam longitudinaliter depressis. Long. 3 mill. Araucanie. — Très distinct du précédent, par la forme plus allongée, la coloration, le prothorax moins large.

**Arthrobrachus vicinus** n. sp. Elongatus, nitidus, sparse hirsutus, viridi-metallicus, elytris rufis, ad suturam antice longe viridi notatis ; thorace breve, antice valde attenuato et subarcuato, fortiter sat sparse punctato, in disco sulcatulo ; elytris elongatis, fortiter sat dense punctatis. Long. 5 mill. République Argentine. — Très voisin de *A. nigromaculatus* Sol., ponctuation prothoracique plus écartée et dessins métalliques des élytres différents, formant une longue bande suturale, un peu atténuée postérieurement.

**Arthrobrachus nigromaculatus v. nov. Solieri.** Elytris rufis, antice et ad suturam late nigro-metallico vittatis, postice in disco metallico maculatis, sutura nigra. Chili.

**Arthrobrachus impressithorax** n. sp. Elongatus, nitidus, sparse et longe hirsutus, nigro-viridescens, capite sat dense punctato, antice late impresso ; thorace breve, antice valde attenuato et transverse depresso, postice minute im-



presso, fortiter sat sparse punctato ; elytris elongatis, fortiter sat dense punctatis, apice subacuminatis. Long. 6 mill. Rép. Argentine. — Voisin de *A. subaeneus* Phil., par sa coloration, mais prothorax différent, tête largement impressionnée en avant, etc.

**Arthrobrachus 4-guttatus** (Germ.). Elongatus, parum nitidus, fortiter et dense punctatus, sparse hirsutus, nigro-subcœruleus, elytris ante medium et ante apicem testaceo-luteo maculatis. Long. 4 à 5 mill. Chili. — Voisin de *A. 4-punctatus* Phil., mais macule antérieure des élytres éloignée de la base, subtransversale, sommet des élytres non crénelé, etc.

**Arthrobrachus Lajoyei** n. sp. Robustus, nitidus, parum pubescens, niger, elytris rufo cinctis, antennis pro parte, geniculis, tibiis tarsisque rufis ; capite thoraceque fortiter sat sparse punctatis ; elytris satis brevibus, sat minute et parum dense punctatis. Long. 3 mill. Montevideo. — Voisin de *A. testaceolimbatus* Steinh., mais suture foncée et ponctuation différente.

**Arthrobrachus tibialis** v. nov. **inlineatus**. Elytris pallidis, nitidis, minute punctatis, piceo-cinctis. Chili.

**Arthrobrachus varians** v. nov. **infuscatus**. Elytris in disco late nigris et pallido cinctis, ad basin luteo notatis. Chili.

**Arthrobrachus dubius** (Germ.). Robustus, parum nitidus, elytris pallidis, ad humeros nigro maculatis et lateraliter minute nigro cinctis, his brevibus, fortiter et dense punctatis, pedibus nigris. Long. 4 mill. Chili (ex coll. Germain). — Voisin de *A. limbatus* Sol., plus fortement ponctué, coloration élytrale différente, etc.

**Arthrobrachus limbatus** v. **inlimbatus**. Elytris concoloribus, nigris. Chili.

**Apalochrus** s. g. nov. **Cladapalochrus**. Antennis satis gracilibus, in mare longe flabellatis, pedibus pro parte monstrosis. — Sous-genre établi pour *A. festivus* Er. et espèces voisines.

**Apalochrus s. g. nov. Trogloapalochrus.** Capite excavato et tuberculato, antennis in mare breve flabellatis, pedibus simplicibus. — Sous-genre établi pour *A. bicornutus* Pic.

**Apalochrus s. g. nov. Spinapalochrus.** Coxis anticis dentatis, pedibus simplicibus. — Sous-genre établi pour *A. rufofasciatus*, ci-dessous décrit, et *A. malabarensis* Pic.

**Spinapalochrus rufofasciatus** n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin, thorace pedibusque pro parte rufo-testaceis, elytris atro-cyaneis, ad medium rufo-fasciatis et apice minute rufo notatis; coxis anticis ♂ dentatis et capite lateraliter antice elevato. Long. 4 mill. Tonkin (coll. Pic). — Très voisin de *A. malabarensis* Pic, fascie élytrale moins prolongée sur la suture, côtés de la tête plus élevés chez ♂.

**Apalochrus tonkineus** n. sp. ♂. Elongatus, parum nitidus, mediocre griseo pubescens, niger, supra cyaneo-subviolaceus. — Antennes robustes, prothorax assez court, étranglé et un peu gibbeux postérieurement; élytres allongés, densément ponctués; tibias antérieurs sinués, intermédiaires subarqués et très dilatés. Long. 3 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *A. crassicornis* Pic.

**Apalochrus depressicornis** n. sp. ♂. Elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, supra nigro-viridescens; antennis nigris, longissimis, apice depressis; tibiis intermediis valde dilatatis. Long. 3 mill. Indes. — Voisin du précédent, antennes plus longues, tibias intermédiaires non arqués, prothorax peu rétréci à la base.

**Laius latefasciatus** n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, cyaneo-viridescens, antennis pedibusque testaceis, elytris ad medium late testaceis. Long. 3 mill. Formose. — Voisin de *L. Pellegrini* Pic, moins allongé, fascie élytrale moins pâle, antennes différentes, avec le 1<sup>er</sup> article peu épais, assez long, le 3<sup>e</sup> difforme et creusé, pas très transversal.

**Laius 6-maculatus** n. sp. Oblongus, subopacus, niger,

antennis ad basin rufo notatis, elytris antice uni et postice bi-albo maculatis. Long. 3 mill. Formose. — Le ♂ a le front un peu creusé en avant et bordé, le premier article des antennes sinué et denté, le 3<sup>e</sup> difforme, creusé et muni d'un angle épineux dirigé en avant. — Voisin de *L. inarmatus* Pic, 3<sup>e</sup> article des antennes différent et élytres ayant chacun 2 macules postérieures juxtaposées.

**Ebaeus madrasensis** n. sp. ♀. Oblongus, nitidus, antennis pedibusque pro parte testaceis; antennis satis gracilibus; thorace breve, minute punctato; elytris brevibus et latis, minute punctatis; pygidio prominulo. Long. 2 mill. Indes : Madras. — A placer près de *E. ater* Ksw.

**Attalus meridanus** n. sp. ♀. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, thorace rufo, in disco nigro notato, elytris nigris, signaturis rufis ornatis. — Cette espèce offre une coloration élytrale particulière, faite d'une bordure suturale rousse, élargie en avant, mais n'atteignant pas la base, avec une autre apicale rousse, en outre une macule médiane externe de même coloration. Long. 2,5 mill. Vénézuéla : Mérida. — Sans doute voisin de *A. stigma* Er.

**Attalus meridanus v. nov. Lajoyei.** Elytris rufis, ad basin nigro fasciatis et postice nigro maculatis. Vénézuéla.

**Attalus meridanus v. nov. brevistigma.** Elytris nigris, ad suturam medio testaceo maculatis. Vénézuéla.

**Attalus Germaini** n. sp. Elongatus, apice dilatatus, nitidus, atro-metallicus, elytris viridescentibus, antennis ad basin pedibusque pro parte rufis; elytris fere impunctatis. — Long. 2,5 mill. Bolivie (Germain). — Très voisin de *A. boliviensis* Pic, distinct, à première vue, par les élytres presque impunctués et l'avant-corps plus noir.

**Attalus nigricornis v. nov. innotatipennis.** Rufo-testaceus, oculis, antennis pedibusque pro majore parte nigris. Guatemala.

**Attalus nigricornis v. nov. brevenotatus.** Elytris rufis, ad humeros breve nigro notatis. Guatemala.

**Attalus rufipennis v. nov. guatemalanus.** Elytris rufis, ad basin transverse nigro fasciatis, capite thoraceque nigris. Guatemala.

**Attalus subimplicatus** n. sp. Robustus, apice dilatatus, nitidus, niger, elytris rufis, ad basin nigro maculatis, labro testaceo ; elytris antice et lateraliter plicatis et impressis. Long. 3 mill. Guatemala. — A placer près de *A. carinatus* Gorh., distinct par l'avant-corps noir, les élytres simplement plissés et plus courts.

**Attalus erythropterus** (Piller). Je possède sous ce nom, et originaires du Yucatan (ex coll. Armitage), deux exemplaires qui ont une coloration analogue au précédent, avec les élytres entièrement testacés et l'avant-corps foncé, mais qui doivent constituer deux espèces. Je laisse le nom de *erythropterus* à l'exemplaire ayant la tête noire, les élytres munis latéralement d'une forte et longue carène. Je donne le nom de *trimaculaticeps* à l'autre exemplaire qui a la tête trimaculée de flave antérieurement et les élytres non carénés.

**Attalus jalapanus** n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger, capite antice, thorace, illo in disco nigro lineato, antennis ad basin pedibusque pro majore parte testaceis, elytris nigro plumbeis, subopacis, hirsutis. Long. 3 mill. Mexique : Jalapa. — Ressemble à *A. mexicanus* Pic, mais tête plus grosse et claire antérieurement, prothorax non concolore, etc.

**Attalus atrocinctus** n. sp. Oblongus, nitidus, ater, elytris in disco late luteis ; antennis ad basin testaceis, apice dentatis ♀, aut flabellatis ♂. Long. 2 mill. Brésil. — Voisin de *A. mirabilis* Pic, par les antennes flabellées ♂, mais prothorax entièrement foncé et coloration élytrale différente.

**Attalus diversicornis** n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger, elytris viridescentibus, antennis ad basin, geniculis tibiisque testaceis ; elytris apice depressis ; antennis apice



dentatis ♀, aut pectinatis ♂. Long. 3 mill. Bogota. — Espèce très distincte par les antennes différentes, suivant les sexes, conjointement à la coloration générale métallique.

**Attalus bahianus** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, hirsutus, elytris nigro-subæneis, apice pallido marginatis ; antennis nigris, ad basin testaceis ; pedibus pro majore parte nigris. Long. 2,5 mill. Brésil : Bahia. — Voisin de *A. tapanus* Chp., par son système de coloration.

**Attalus 4-signatus** (Chevr.). Oblongus, satis latus, parum nitidus, rufo-testaceus, nigro maculatus, capite rufo, nigro maculato ; thorace rufo-testaceo, in disco late nigro ; elytris brevibus, lateraliter carinatis, rufis aut testaceis, antice et postice late nigro maculatis ; pedibus et infra corpore pro parte rufis. Long. 3 mill. Brésil. — Voisin de *A. ruficeps* Pic, forme plus trapué, tête maculée de foncé, etc.

**Attalus goyasensis v. subbasalis** Pic. Capite thoraceque pro majore parte nigris, scutello nigro ; elytris testaceis, ad basin nigro maculatis. Brésil.

**Attalus teapasensis** n. sp. Oblongo-parallelus, nitidus, pro parte niger, pro parte testaceus ; capite nigro, antice testaceo ; thorace robusto, testaceo, in disco breve nigro notato ; scutello nigro ; elytris satis brevibus, in disco late nigro-metallicis, lateraliter et postice testaceis ; pedibus pro majore parte nigris. Long. 2,5 mill. Mexique. Teapa. — Peut se placer près de *A. pusillus* Gorh., mais dessins foncés des élytres différents et tête en partie foncée.

**Attalus Schneideri** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite thoraceque testaceis, elytris testaceis, ad basin et postice late nigro maculatis, pedibus pro majore parte nigris, tibiis posticis simplicibus. Long. 2,5 mill. Mexique : Jalapa. — Très voisin de *A. pusillus* Gorh., mais écusson noir et macules élytrales rapprochées, ayant de la tendance à se joindre.

**Attalus nicaraguensis** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite antice testaceo notato, elytris rufo-testaceis, ad basin et postice nigro maculatis. Long. 3 mill. Nicaragua. — Voisin du précédent, mais moins brillant, prothorax noir, etc.

**Attalus spinipes** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, supra testaceus, nigro maculatus, capite nigro, rufo-notato ; thorace testaceo, antice nigro bimaculato ; elytris testaceis, ad basin et postice nigro maculatis, his parum latis ; pedibus pro majore parte nigris, tibiis posticis curvatis et apice longe mucronatis. Long. 2,5 mill. Brésil : Bahia. — Par la structure de ses tibias, se rapproche de *A. varius* Chp., moins robuste, avec le prothorax maculé de foncé et les élytres à grande macule postérieure noire.

**Attalus bogotanus** n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, niger, capite thoraceque testaceis ; elytris testaceis, ad basin et postice nigro maculatis ; pedibus pro majore parte nigris ; tibiis posticis apice brevis mucronatis. Long. 3 mill. Bogota. — Voisin du précédent, mais mucron des tibias postérieurs plus court, prothorax entièrement testacé, etc.

**Attalus impressifrons** n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, hirsutus, viridi-metallicus, pedibus nigris ; antennis pro parte testaceis, pro parte nigris, longe flabellatis ; fronte transverse impresso ; elytris brevibus, antice impressis. Long. 4 mill. Indes. A placer près de *A. Bang-Haasi* Pic, tête et antennes de structure différente.

**Attalus carinatifer** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace testaceo, in disco nigro maculato ; antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis ; elytris testaceis, ad basin et postice cyaneo maculatis, elongatis, lateraliter carinatis, dense punctatis, abdomine pro parte testaceo. Long. 3 mill. Indes. — Ressemble à *A. cyaneonotatus* Pic, plus allongé, prothorax maculé de foncé, etc.

**Tucumanus pygidialis** n. sp. Subovatus, minutus, niti-

dus, mediocre pubescens, antennis, geniculis, tibiis tarsisque testaceis ; tibiis posticis apice arcuatis ; abdomine apice prominulo. Long. 1,5 mill. Brésil. — A placer près de *T. (Pseudattalus) minimus* Er.

**Tucumanus arcuatipes** n. sp. Oblongus, nitidus, parum pubescens, nigro-cyanescens, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis ; capite antice depresso ; thorace transverso, postice marginato ; elytris apice dilatatis, sat fortiter punctatis ; tibiis posticis apice arcuatis, pro parte piceis. Long. 2 mill. Brésil. — A placer près de *T. punctatus* Gorh.

**Discodon martapuranum** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus, elytris nigris ; antennis parum depressis ; thorace elongato, lateraliter sinuato. Long. 9 mill. Bornéo : Martapura. — Voisin de *D. scobanum* Pic, prothorax différent, élytres plus brillants.

**Discodon tolinum** n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger, capite antice, antennis, pedibus abdomineque pro parte testaceis ; elytris nigris, lateraliter pro parte flavo marginatis. Long. 7 mill. Célèbes : Toli. — Moins allongé que le précédent, avec les élytres bordés de flave latéralement.

**Discodon opacum** n. sp. Elongatus, opacus, dense pubescens, niger, capite antice, femoribus ad basin et infra corpore pro parte testaceis ; thorace subsinuato, lateraliter pro parte rufo marginato et rufo notato. Long. 12 mill. Célèbes. — Voisin de *D. Rocholli* Pic, plus allongé, nettement pubescent, avec le prothorax bicolore, etc.

**Discodon roonense** n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, capite, elytris apice abdomineque postice nigris ; thorace robusto, subsinuato, antice nigro notato. Long. 6 mill. Océanie : Roon. — Espèce très distincte par sa coloration, pouvant se placer près de *D. Rocholli* Pic.

**Discodon atricolor** n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, abdomine rufo notato, mandibulis tes-

taceis. Long. 9 mill. Ile Banguay. — Voisin de *D. Rouyeri* Pic, mais prothorax foncé, élytres plus parallèles, etc.

**Discodon curticolle** n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger, capite antice, thorace, tibiis ad basin abdomineque pro parte testaceis ; antennis nigris, ad basin testaceo notatis, subdentatis ; thorace breve, supra inæquale ; elytris brevibus. Long. 7 mill. Nouvelle-Guinée. — Espèce très distincte par sa petite taille, jointe à ses grosses antennes dentées.

**Discodon curvatipes** n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger, thorace testacéo, in disco antice late nigro maculato ; thorace lateraliter sinuato ; tibiis posticis curvatis. Long. 7 mill. Bornéo. — Voisin du précédent.

**Silis semitestaceicornis** n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, nigro piceus, capite, thorace, scutello pedibusque pro parte rufo-testaceis ; antennis nigris, apice rufescentibus, satis robustis ; capite breve ; thorace transverso, sinuato, postice lateraliter plicato ; elytris satis brevibus, minute punctatis. Long. 7 mill. Nouvelle-Guinée. — Peut se placer près de *S. brevis* Pic, très distinct par sa structure prothoracique.

**Silis Fochi** n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, antennis pro parte, tibiis apice et tarsis nigris, elytris nigris, antice ad suturam longe testaceis ; thorace ♂ breve, lateraliter postice valde prominulo et plicato. Long. 8 mill. Nouvelle-Guinée. — Voisin du précédent.

**Silis Clemenceau** n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, capite antice, thorace elytrisque ad basin satis breve testaceis, abdomine testaceo marginato ; antennis satis validis ; thorace breve, antice et postice marginato ; lateraliter breve inciso ; elytris satis elongatis, rugulosis. Long. 6 mill. Timor. Plus allongé que les précédents avec le prothorax autrement conformé. Peut se placer près de *S. satanas* Pic, dont la coloration est entièrement foncée.

**Silis Petaini** n. sp. ♀. Oblongo-elongatus, nitidus, gri-



seo pubescens, niger, thorace rufo, antice minute nigro notato; antennis satis validis; thorace brevè, lateraliter subsinuato, postice parum dilatato; elytris parum elongatis. Long. 6 mill. Bornéo. — Voisin de *S. satanas* Pic et distinct, à première vue, par sa coloration.

? **Tylocerus discoviridis** n. sp. ♀. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis, geniculis, tibiis tarsisque nigris, elytris viridibus, ad suturam et lateraliter testaceo limbatis; capite breve, antennis apice attenuatis, articulo 1° parum incrassato; thorace breve, lateraliter subarcuato; elytris brevibus. Long. 7 mill. Haïti. — Espèce très distincte par sa petite taille, son aspect robuste, en même temps que sa coloration élytrale.

**Tylocerus (1) amboinensis** n. sp. ♀. Elongatus, subparallelus, nitidus, rufo-testaceus, antennis tarsisque nigris; elytris nigris, ad suturam et lateraliter pallido cinctis. Long. 9 mill. Amboine. — Voisin de *T. lineatipennis* Pic, plus allongé avec la bordure claire plus étroite.

**T. Ribbei** n. sp. ♂. Satis elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus antennis, geniculis, tibiis tarsisque nigris, elytris nigris, lateraliter minute testaceo marginatis; articulo 1° antenarum valido, globuloso. Long. 8 mill. Océanie: Nioko. — Voisin de *T. subcrassicornis* Pic, plus allongé, pattes en partie testacées, etc.

**T. Dohertyi** n. sp. ♀. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite, scutello abdomineque pro parte rufo-testaceis, thorace rufo-testaceo, lateraliter late nigro-marginato. Long. 7 mill. Batjhan. — Voisin du précédent.

**T. semirugulosus** n. sp. ♀. Angustatus, parum nitidus, testaceus, capite, antennis, geniculis, tarsis, elytris que nigris, his ad suturam et lateraliter breve testaceo marginatis, bicostatis, pro parte rugulosis. Long. 11 mill.

(1) Cette espèce et les suivantes peut rentrer dans le s.-g. *Tylocerocorneus* Pic.

Océanie : Menado. — Espèce remarquable par sa forme allongée, ses élytres nettement costés, etc.

**T. gracilicornis** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus, capite, antennis, pedibus pro majore parte elytrisque apice late nigris ; antennis longissimis, articulo 1<sup>o</sup> elongato, parum incrassato ; pedibus longissimis, nigris, femoribus ad basin testaceis. Long. 10 mill. Nouvelle-Guinée. — Espèce très distincte par ses longs membres.

**T. longesuturalis** n. sp. ♀ Elongatus, subparallelus, parum nitidus, testaceus, antennis, pedibus pro parte et abdomine piceis, elytris nigris, antice ad suturam longe testaceo notatis. Long. 8 mill. Nouvelle-Guinée. — Voisin de *T. neoguineensis* Pic, mais macule basale claire très prolongée en arrière sur la suture.

**T. Humbolti** n. sp. ♀ Oblongo-elongatus, nitidus, testaceus, capite postice elytrisque apice parum late nigris. Long. 8 mill. Nouvelle-Guinée. — Voisin de *T. batjanensis* Pic, mais de forme plus robuste, avec les élytres nettement et transversalement marqués de noir au sommet.

**T. subopacus** n. sp. ♀ Oblongo-elongatus, nitidus, testaceus, antennis nigris, ad basin rufo-notatis, elytris testaceis, apice et lateraliter longe nigro-notatis. Long. 9 mill. Nouvelle-Guinée. — Distinct, à première vue, des précédents, par sa grande macule apicale foncée remontant sur les côtés.

**T. breveapicalis** n. sp. ♂ Parum elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus, antennis tarsisque rufis ; articulo primo antennarum rufo, valido, globuloso ; elytris testaceis, apice sat breve nigro notatis. Long. 8 mill. Nouvelle-Guinée. — Voisin des précédents.

**T. subcrassicornis** n. sp. ♀ Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis tarsisque nigris. Long. 10 mill. Nouvelle-Guinée. — Voisin des précédents et distinct, à première vue, par les élytres dépourvus de macule apicale foncée.

**T. inapicalis** n. sp. ♀. Satis elongatus, parum nitidus, testaceus, antennis tarsisque nigris. Long. 7 mill. Nouvelle-Guinée. — Très voisin du précédent, en diffère par les antennes moins robustes, à 2° article plus long, peu plus court que le 3°.

**T. keiensis** n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis tarsisque nigris, articulo 1° antennarum rufo, satis elongato, crassiusculo ; thorace breve, lateraliter subsinuato ; tibiis paulo curvatis. Long. 9 mill. Ile Kei. — Plus allongé et plus étroit que les espèces précédentes à élytres entièrement testacés.

**T. lateralis** n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis pro parte piceis, elytris testaceis, apice breve piceo maculatis, et lateraliter piceo vittatis. Long. 9 mill. Ile Kei. — Forme du précédent et très distinct par son double dessin apical et latéral sur les élytres.

**T. costulatus** n. sp. Oblongus, parum nitidus, rufo-testaceus ; capite, antennis pedibusque pro parte nigris ; antennis satis validis, articulo 1° in mare mediocre crassiusculo ; thorace plus ♀ minusve ♂, breve sinuato ; elytris satis brevibus, apice attenuatis, in disco costulatis. Long. 7 mill. Ile Tenimber. — Espèce très distincte par ses élytres costulés.

**T. timorensis** n. sp. ♀. Elongatus, parum nitidus, testaceus, capite breve, rufescente ; thorace breve, lateraliter valde sinuato ; elytris elongatis, minutissime costulatis. Long. 7 mill. Timor. — Plus allongé que le précédent, avec le prothorax plus échancré au milieu, etc.

**Plateros suturalis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, nigro-piceus, elytris flavis, ad suturam longe nigro vittatis. Long. 6 mill. Indes. — Voisin et très distinct de *P. expletus* Wat. par sa coloration.

**Plateros rubripennis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace antice rufo marginato, elytris rubris. Long. 8 mill. Indes : Madura. — A placer près de *P. expletus* Wat.

# Sur le genre « Chalcas » Blanch.

En attendant que je publie, si des communications, espérées suffisantes, me le permettent, une revision du genre *Chalcas* Blanch., étudié autrefois par Fairmaire (*Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1849, p. 5), je vais donner ici un tableau dichotomique pour aider à la distinction des espèces par la subdivision des anciens *Chalcas* Blanch. proprement dits en divers sous-genres qui sont surtout distinguables par les ♀ comparées (toutes plus distinctes, entre elles, chez les différentes espèces, que les ♂). Certains ♂, par exemple *Sallei* Frm., *humeralis* Frm., *fumatus* Frm., n'ont pas été nettement distingués par leur descripteur et restent aussi, pour moi, actuellement, difficiles à séparer. Je le répète donc, mon étude dichotomique s'applique plutôt aux ♀. Etant donné la forme très différente des sexes, plus ou moins allongée chez ♀, plus ou moins élargie chez ♂, les ♀ doivent être distinguées entre elles séparément des ♂, si l'on veut éviter toute équivoque.

Voici les principaux caractères donnés par Blanchard, en 1845, pour son genre *Chalcas*, rentrant dans les *Malacodermes* : antennes plus courtes que la tête et le prothorax réunis, épaisses, en dents de scie courtes ; pattes comprimées, crochets des tarses bifides ; élytres très larges, surtout dans les mâles.

Le genre *Chalcas* Blanch. se distingue surtout des *Astylus* Cast. par l'absence d'épipleures, ou ceux-ci réduits et courts, seulement marqués antérieurement. J'ai établi, dans les premières pages du présent fascicule, un genre et un sous-genre (démembrant les anciens *Chalcas* Blanch. à faciès astyliforme) qui sont : *Astylomorphus* et s.-g. *Pseudoastylus*. Ce sous-genre seul sera compris dans le présent tableau.



Les *Chalcas fasciculatus* Pic et *abnormis* Frm. peuvent rentrer dans mon genre *Astylomorphus*.

Il est probable que l'ancien *Chalcas 6-plagiatus* Frm., que je ne connais pas en nature, se rapproche de *Pseudoastylus plicatus* Pic et doit rentrer dans le même groupement.

La présente étude abrégée sera complétée par le signalement descriptif de quelques variétés nouvelles faisant toutes partie de ma collection.

1 Elytres sans épipleures, ou à épipleures courts et marqués à leur base seulement, sans pli relevé sur le bord antérieur. 2

1' Elytres à épipleures indistincts et à rebord relevé antérieurement en dessus sous forme de pli.

**Pseudoastylus plicatus** Pic.

2 Elytres non fortement entaillés en dedans vers le milieu ; ♂ à épaules marquées, saillantes, parfois arrondies. 3

2' Elytres fortement entaillés en dedans vers leur milieu ; ♂ à épaules tout à fait nulles.

(*obesus* Frm.) s. g. **Chalcomorphus**.

3 Elytres munis d'une carène externe variable, mais plus ou moins éloignée du rebord externe qu'elle ne cache pas en dessus ; ♂ sans carène. 4

3' Elytres avec une carène marquée dans les deux sexes, rapprochée postérieurement du bord latéral qu'elle cache en grande partie par dessus ; la carène se retourne à l'extrémité, sous forme de pli caréniforme.

(*lineatocollis* Frm., *cyaneus* Frm., *lateralis* Frm.)

s. g. **Morphochalcas**.

4 Carène latérale effacée à la base, et élytres sans, ou à faible, protubérance postérieure ; ♂ à épaules non gibbeuses, largement arrondies.

(*strabeatus* Frm., *lugubris* Frm.)

s. g. **Dimorphochalcas**.

4' Carène latérale très saillante, ou tout au moins marquée en avant, élytres avec un fort tubercule posté-

rieur au bout de la carène ; ♂ à épaules plus ou moins relevées, ou plissées et flanquées d'une dépression interne. (*humeralis* Frm. et voisins, *unicolor* Frm.)

**Chalcas s. str.**

**Chalcas fumatus v. nov. discoidalis** ♀. Elytris in disco et ad suturam late et longe rufo-testaceis. Colombie.

**Chalcas fumatus v. nov. scutellaris** ♀. Elytris nigro cœruleis, lateraliter, ad scutellum et postice testaceo notatis. Vénézuëla.

**Chalcas lugubris v. nov. trinotatus** ♂. Elytris luteo trimaculatis, maculis longitudinaliter dispositis. Colombie.

**Chalcas lugubris v. nov. quadrinotatus** ♂. Elytris antice posticeque luteo maculatis et ad medium luteo bimaculatis. Colombie.

**Chalcas lugubris v. nov. multinotatus** ♂. Elytris antice et ad medium luteo bimaculatis, postice luteo unimaculatis. Colombie.

**Chalcas Bremei v. nov. octonotatus** ♂. Elytris viridibus, octo luteo notatis (1, 2, 3, 2). Colombie.

**Chalcas Bremei v. nov. reductus** ♂. Elytris antice posticeque luteo maculatis et ad medium luteo bimaculatis. Amérique Méridionale.

**Chalcas trabeatus v. nov. interruptus** ♂. Fascia postica nigra elytrorum interrupta. Colombie.

**Chalcas humeralis v. nov. unifasciatus** ♂. Elytris antice nigro fasciatis. Vénézuëla.

**Chalcas Lajoyei v. nov. bimaculatus** ♂. Elytris in singulo antice supra luteo maculatis. Bogota.

**Chalcas Sallei v. nov. notatus** ♂. Elytris pallidis, ad basin nigro maculatis et postice lateraliter minute nigro maculatis. Amérique Méridionale.

**Chalcas Sallei v. nov. fasciatus** ♂. Elytris antice nigro-cœruleo fasciatis et postice maculatis. Vénézuëla.

---

TABLE  
POUR LE TRENTIÈME FASCICULE

---

	Pages.
Nouveautés diverses . . . . .	1
Sur le genre <i>Chalcas</i> Blanch. . . . .	22

---

---

